

Exercice 1. Représenter graphiquement les sous-ensembles suivants de \mathbb{R}^2 . Sont-ils des ouverts ?
Aucune justification n'est demandée.

1. $A = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$
2. $B = [0, 1] \times [0, 1]$
3. $C =]0, 1[\times]0, 1[$
4. $D = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$
5. $E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$
6. $F =]1, +\infty[\times \mathbb{R}_+^*$
7. $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$
8. $H = (\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}) \times \mathbb{R}_+^*$
9. $I = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \geq 1\}$

Exercice 2. On considère la fonction f définie sur \mathbb{R}^2 par $f(x, y) = xy$.

1. Montrer que f est continue sur \mathbb{R}^2 .
2. Déterminer les lignes de niveau de f .

Exercice 3. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe C^1 sur U et calculer leurs dérivées partielles.
(On ne demande pas de justifier que U est ouvert)

1. $\forall (x, y) \in U = \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^2 + 3x^2y - xy + y^2$.
2. $\forall (x, y) \in U = \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y)(1 - 2x - 2y)$.
3. $\forall (x, y) \in U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.
4. $\forall (x, y) \in U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, f(x, y) = x(\ln(x) + x + y^2)$.
5. $\forall (x, y) \in U = \mathbb{R}^2, f(x, y) = xy e^{-x^2 - y^2}$.
6. $\forall (x, y) \in U =]0, +\infty[\times]1, +\infty[, f(x, y) = \frac{\sqrt{x}}{\ln(y)}$.
7. $\forall (x, y) \in U = \mathbb{R}^2, f(x, y) = e^{xy} \ln(1 + x^2 + y^2)$.

Exercice 4. Soit f une fonction de classe C^1 sur \mathbb{R}^2 et qui vérifie $\forall t \in \mathbb{R}, f(t, t^2) = 1$. En utilisant la règle de la chaîne, montrer que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$.

Exercice 5. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $f(x, y) = e^{xy^2}$. Soit $t \in \mathbb{R}$, on pose $x(t) = t \cos(t)$ et $y(t) = t \sin(t)$. Montrer que $\varphi : t \mapsto f(x(t), y(t))$ est de classe C^1 sur \mathbb{R} et calculer sa dérivée en utilisant la règle de la chaîne.

Exercice 6. Soit $(x, y) \mapsto f(x, y)$ une fonction de classe C^1 sur \mathbb{R}^2 , pour laquelle on donne les valeurs suivantes :

$$f(-1, 3) = 7, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(-1, 3) = -5, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(-1, 3) = 4.$$

Pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, on pose $g(u, v) = f(5u + 3v - 1, 8u - 6v + 3)$. Montrer que g est de classe C^1 sur \mathbb{R}^2 et déterminer les valeurs de $\frac{\partial g}{\partial u}(0, 0)$ et $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0)$.

Exercice 7. On s'intéresse aux fonctions f définies de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R} , de classe C^1 sur \mathbb{R}^2 et vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad 2 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

1. Soit f une fonction de classe C^1 de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R} . Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $u = x + y, v = x + 2y$ et :

$$g(u, v) = g(x + y, x + 2y) = f(x, y).$$

Étudier la dérivabilité de la fonction g sur \mathbb{R}^2 .

2. Exprimer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ en fonction de u, v et des dérivées partielles de g .
3. En déduire l'ensemble des fonctions f qui satisfont les conditions de l'énoncé.

Exercice 8. Déterminer les points critiques de la fonction f définie sur \mathbb{R}^2 par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = xy(x + y - 1).$$

Exercice 9. Déterminer les points critiques de la fonction f définie sur \mathbb{R}^2 par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = xy e^{-(x^2 + y^2)}.$$

Exercice 10. On considère la fonction f définie sur \mathbb{R}^2 par $\forall(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$.

1. Montrer que $(0, 0)$ est un point critique de f .
2. Déterminer un équivalent de $f(x, x) - f(0, 0)$ et de $f(x, 0) - f(0, 0)$ lorsque x tend vers 0. La fonction f présente-t-elle un extremum en $(0, 0)$?

Exercice 11. Soit f définie sur \mathbb{R}^2 par : $\forall(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 9x^2 + 8xy + 3y^2 + x - 2y$.

1. Déterminer l'unique point critique de f , puis son image par f .
2. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, développer l'expression :

$$3 \left(y + \frac{4}{3}x - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{11}{3} \left(x + \frac{1}{2} \right)^2$$

3. Que peut-on en conclure sur la nature du point critique ?

Exercice 12. Soit f la fonction définie sur \mathbb{R}^2 par : $\forall(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = xe^{x(y^2+1)}$.

1. Justifier que f est de classe C^1 sur \mathbb{R}^2 .
2. (a) Déterminer les dérivées partielles de f .
(b) En déduire que le seul point en lequel f est susceptible de présenter un extremum local est $A = (-1, 0)$.
3. (a) Montrer : $\forall(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) \geq xe^x$.
(b) En étudiant la fonction g définie sur \mathbb{R} par $g(x) = xe^x$, conclure que l'extremum trouvé à la question 2.b) est un extremum global de f sur \mathbb{R}^2 .