

Exercice 1 (★). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour chacune des applications linéaires φ suivantes, déterminer la matrice qui la représente dans une base bien choisie.

1. $\mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$
 $P(X) \mapsto P'(X)$
2. le projecteur sur $\text{Vect}(e_1, e_2)$ parallèlement à $\text{Vect}(e_3)$.
3. $\mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$
 $P(X) \mapsto XP'(X) + \int_0^1 P(t)dt$
4. $\text{Vect}(\cos, \sin, \exp) \rightarrow \text{Vect}(\cos, \sin, \exp)$
 $f \mapsto f'$

Exercice 2 (★). Pour chacune des applications linéaires φ suivantes, déterminer la matrice qui la représente dans la base canonique :

1. la symétrie axiale, dans \mathbb{R}^2 , par rapport à la droite d'équation $y = -x$.
2. la rotation, dans \mathbb{R}^2 , d'angle $\frac{\pi}{2}$ (par rapport à l'origine).
3. la rotation, dans \mathbb{R}^2 , d'angle $\frac{\pi}{6}$ (par rapport à l'origine).

Exercice 3 (★). Soit u l'endomorphisme de \mathbb{R}^3 de matrice $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ dans la base canonique. On

pose $f_3 = (-1, 1, 1)$, $f_2 = u(f_3) - f_3$ et $f_1 = u(f_2) - f_2$.

1. Calculer les coordonnées de f_2 et f_1 dans la base canonique.
2. Vérifier que $\mathcal{B} = (f_1, f_2, f_3)$ forme une base de \mathbb{R}^3 .
3. Donner la matrice N de u dans la base \mathcal{B} .

Exercice 4 (★). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$
 $P(X) \mapsto P(X+1)$.

1. Déterminer la matrice de φ dans la base canonique.
2. Justifier que cette matrice est inversible puis déterminer son inverse sans effectuer de calculs.

Exercice 5 (★). Soit φ l'endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$ défini par $\varphi(P(X)) = 2XP'(X) - (X^2 - 1)P''(X)$.

1. Déterminer la matrice de φ dans la base canonique.
2. A l'aide de cette matrice, déterminer le rang de φ , puis une base de $\text{Im}(\varphi)$ et enfin une base de $\text{Ker}(\varphi)$.

Exercice 6 (★). Déterminer le rang et la dimension du noyau des matrices suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$
2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}$
3. $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
4. $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$
5. $E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
6. $F = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
7. $G = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
8. $H = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

Exercice 7 (★★). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices telles que $AB = 0$ et $(A + B)$ est inversible.

1. Donner un exemple de deux matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ qui vérifient ces hypothèses.
2. Comparer (au sens de l'inclusion) $\text{Im}(B)$ et $\text{Ker}(A)$ et en déduire que $\text{rg}(A) + \text{rg}(B) \leq n$.
3. Comparer $\text{Im}(A + B)$ et $\text{Im}(A) + \text{Im}(B)$ et en déduire que $\text{rg}(A) + \text{rg}(B) = n$.

Exercice 8 (★). Pour les bases suivantes, déterminer la matrice de passage de la base B à la base B' :

1. B est la base canonique de \mathbb{R}^3 et $B' = (u, v, w)$ avec $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 0)$ et $w = (1, 1, -2)$.
2. $B = ((1 \ 0), (0 \ 1), (0 \ 0), (0 \ 0))$ et $B' = ((1 \ 0), (0 \ 1), (1 \ 0), (0 \ 1))$.
3. B est la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ et $B' = (-X^2 + 2X + 1, X + 1, X^2 + 2)$.
4. $B = (1, X - 2, X^2 - 3X + 3)$ et B' est la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 9 (★★). Soit $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ X & \mapsto & AX \end{matrix}$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que φ est un projecteur, et déterminer une base \mathcal{B} adaptée à $\text{Ker}(\varphi - \text{id}) \oplus \text{Ker}(\varphi)$.
2. Déterminer les matrices de passage depuis et vers la base canonique : $P = P_{\mathcal{B}}^{\text{Can}}$ et $P_{\mathcal{B}}^{\text{Can}}$.
3. Sans aucun calcul, justifier que $A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$.

Exercice 10 (★★). Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ associé canoniquement à A .

1. Déterminer une base de $\text{Ker}(u - \text{id})$ et de $\text{Ker}(u - 2 \text{id})$.
2. En déduire une base de \mathbb{R}^3 dans laquelle la matrice B de u est diagonale.
3. Déterminer des matrices P et P^{-1} telles que $A = PBP^{-1}$.
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PB^nP^{-1}$.
5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer B^n puis A^n .

Exercice 11 (★★). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice carrée qui ne contient que des 1. On note f l'application linéaire canoniquement associée à J .

1. Déterminer le rang de f , et la dimension de son noyau.
2. Soit v le vecteur $(1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$ (écrit ici en ligne, mais qui pourra librement être écrit en colonne). Calculer $f(v)$, et montrer qu'il s'agit d'un vecteur colinéaire à v .
3. Soit (u_1, \dots, u_{n-1}) une base de $\text{Ker}(f)$. Justifier que la famille $\mathcal{B} = (v, u_1, \dots, u_{n-1})$ est une base de \mathbb{R}^n .
4. Déterminer la matrice de f dans cette base \mathcal{B} . On notera \tilde{J} cette matrice.
5. Expliciter des vecteurs u_1, \dots, u_{n-1} qui conviennent comme base de $\text{Ker}(f)$.
Conseil : bricoler avec les colonnes de J .
6. En déduire la relation de passage entre J et \tilde{J} , à l'aide de matrices de passages que l'on précisera (au moins l'une des deux).